

## 血管性浮腫の鑑別診断

### 蕁麻疹(膨疹)を伴う 血管性浮腫



### アレルギー性血管性浮腫を疑う

#### 外的誘因を調べる

- アレルギー: 食べ物、薬剤、虫さされ など
- 抗ヒスタミン薬、ステロイド薬、エピネフリンに反応する

#### 症状と既往歴

- 食べ物
  - 甲殻類、魚
  - ピーナッツ、ナッツ
  - 卵、牛乳
  - イチゴ類、トマト
  - 大豆、小麦
- 薬剤
  - ACE阻害薬
  - 抗生物質
  - 局所麻酔薬
  - NSAIDs、アスピリン、麻薬
  - X線造影剤
- 虫さされ
- あまり一般的ではない原因
  - 吸入: 塵ダニ、花粉、カビ、ペット、ゴキブリ
  - 接触: 化粧品、洗濯石けん など

#### コンサルテーション

- 精密検査を行うためにアレルギー専門医へ紹介する

#### 蕁麻疹を伴わない血管性浮腫の原因

- 特発性
- 機能的C1-INH欠損症
- 特異的アレルギー、物理的刺激
- ACE阻害薬
- 自己免疫性疾患、感染症
- 末梢または全身性浮腫